

## MICSAUDE - II MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS CURSOS DA SAÚDE

## LÍQUEN PLANO RETICULAR E EROSIVO E SUAS ALTERAÇÕES ORAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

<sup>1</sup> Pâmela Taciane Canepelle Richter<sup>1</sup> Suélen Aparecida Sauer<sup>1</sup> Fernanda Helaine Cidade<sup>1</sup> Leonardo Weber Fabião<sup>1</sup> Rodrigo Marin<sup>1</sup> Mara Luiza Pilz Maldaner<sup>1</sup> Luisa Dockhorn<sup>1</sup> Centro Universitário FAI, Itapiranga, Santa Catarina, Brasil<sup>1</sup> Curso de Odontologia – UCEFF / Itapiranga – SC**Grande área do conhecimento:** Ciências da Saúde**Modalidade:** apresentação oral

**INTRODUÇÃO:** O Líquen Plano oral, é uma doença crônica dermatológica comum que acomete normalmente a mucosa oral, podendo ocorrer na pele, unhas e na mucosa genital. A etiologia dessa doença é desconhecida mas possui evidências de associação entre as quais podemos destacar: ansiedade, doenças autoimunes, diabetes, doenças intestinais, drogas, hipertensão, estresse, infecção, neoplasias e predisposição genética. O líquen plano bucal apresenta-se com maior frequência nas formas reticular e erosiva, sendo mais comum o líquen plano reticular. Sua localização mais comum é a região posterior da mucosa jugal bilateral, apresentando finas estrias brancas que se entrelaçam denominadas "estrias de Wickham". Essas lesões não são estáticas, melhorando e piorando em meses, sem apresentar sintomatologia dolorosa. Já a forma erosiva é sintomática e caracterizada por áreas eritematosas atróficas com diferentes graus de ulceração central coberta ou não por placa de fibrina ou pseudomembranosa, que podem ser circundadas por estrias brancas queratinizada ou rendilhadas. Em alguns casos, a atrofia e ulceração se encontram englobadas na mucosa gengival produzindo uma gengiva descamativa tornando-se necessário executar uma biópsia incisional. Essa descamação pode ocorrer de forma agressiva, causando a separação do epitélio e o tecido conjuntivo subjacente, ocasionando um subtipo chamado de líquen plano bolhoso. Histologicamente apresenta variados graus de orto e paraceratose, com espessura da camada subjacente variada, sendo sua principal característica as cristas epiteliais pontiagudas chamadas de "dentes em serra". Também há destruição da camada basal sendo acompanhada de um intenso infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário. O tratamento do líquen plano erosivo é através de corticosteroide tópico ou sistêmico como por exemplo a Betametasona. Já o reticular não necessita de tratamento pois não há sintomas envolvidos. **OBJETIVO:** Revisar a literatura existente sobre líquen plano reticular e erosivo, e suas alterações orais. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, por meio de buscas nas bases de dados PubMed/Medline, BVS, Scielo e Google acadêmico, utilizando as seguintes palavras-chaves "Liquen plano – Imunossupressão – Doença dermatológica". **RESULTADOS:** Estudos prévios sugerem que as lesões podem apresentar-se isoladas ou assumindo arranjos arboriformes, estriados ou anulares, sendo estes aspectos comuns na mucosa jugal bilateralmente. Na forma erosiva, observam-se erosões vermelho-brilhantes bem demarcadas, caracteristicamente rodeadas de pápulas típicas. Em quadros de rápida evolução, bolhas podem, raramente, ser observadas. A dor é, em geral, intensa e capaz de interferir na qualidade de vida. Além disso, as lesões no dorso lingual tendem a ser mais queratósicas, isoladas ou confluentes em placas, devido às características peculiares desse epitélio. As lesões de longa evolução tendem a tornar-se atróficas, devido à retificação do epitélio. Despilação lingual, devido à atrofia, pode resultar em alterações gustatórias, com conseqüente ardor ao contato com certos alimentos **CONCLUSÃO:** De acordo com a literatura, podemos concluir que o líquen plano oral, apresenta uma grande variação em relação às manifestações clínicas. Desta forma, podemos destacar que a biópsia incisional para uma análise histopatológica detalhada é essencial para confirmar o diagnóstico e obter o sucesso do tratamento.

**Palavras-chave:** Líquen plano, imunossupressão, doença dermatológica.**Centro Universitário**

49 3678 8700

Rua Carlos Kummer - 100

Bairro Universitário

Itapiranga - SC | 89896-000

**Unidade Central**

49 3319 3838

Rua Lauro Müller - 767 E

Bairro Santa Maria

Chapecó - SC | 89812-214

**Unidade Palmital**

49 3319 3800

Av. Irineu Bornhausen - 2045 E

Bairro Quedas do Palmital

Chapecó - SC | 89814-650